



A Leptospirose é uma doença infecto-contagiosa provocada por uma bactéria que acomete animais domésticos e o homem. Sua principal fonte de transmissão é o rato. Nos bovinos adultos produz um quadro com alterações reprodutivas e nas demais espécies, incluindo o homem, causa alterações renais, hepáticas e outras, que se não diagnosticadas a tempo provocam sequelas irreversíveis ou mesmo a morte.

A Brucelose é uma zoonose infecto-contagiosa provocada por uma bactéria. Produz aborto e esterilidade nas fêmeas, e orquite e esterilidade nos machos. Artrite com febre intermitente também é observada.

Método utilizado para Leptospirose: Microaglutinação.

Métodos utilizados para Brucelose: Antígeno Acidificado Tamponado - AAT - e Mercaptoetanol - 2 ME.

Quem pode solicitar o exame: Para exame de brucelose, somente Médico Veterinário habilitado no Ministério da Agricultura.

Coleta da amostra: A amostra (soro) deve ser coletada pelo Médico Veterinário, acondicionada em frasco de vidro tipo penicilina, identificada, congelada ou resfriada e em caixa de isopor lacrada.

Valor da taxa: [Sob consulta](#)

Prazo de liberação de resultados para Brucelose: Até 10 dias úteis.

Prazo de liberação de resultados para Leptospirose: Até 10 dias úteis.

Pagamento: Por meio do Documento de Arrecadação Estadual - DAE - emitido no Laboratório de Saúde Animal - LSA , nos [escritórios do IMA](#) ou em dinheiro no LSA.

Documentos necessários:

Formulário [Encaminhamento de amostras para diagnóstico de Brucelose](#) preenchido e o resultado do AAT (se a solicitação for 2 ME).

Formulário [Requerimento de reteste para exame de Brucelose](#)

Formulário [Nomeação de portador para Brucelose](#)

Formulário [Requisição do exame de Leptospirose](#)